論文内容の要約

論文名	Increased Advanced Glycation End Products in Hypertrophied Ligamentum Flavum of Diabetes Mellitus Patients (糖尿病患者の肥厚黄色靱帯における終末糖化産物の増加)
氏名	Mohammad Hasib Maruf
<p>【目的】 腰部脊柱管狭窄症は高齢者に多い疾患であり、糖尿病患者では特にその有病率が高いことが知られている。しかしなぜ糖尿病患者において腰部脊柱管狭窄症の有病率が高いかについては未だ不明である。腰部脊柱管狭窄症の主要原因の一つが黄色靱帯の肥厚であること、また糖尿病では終末糖化産物 (AGE) が血管変性に強く関与していることから、我々は黄色靱帯の肥厚についても AGE の関与があるのではないかと考えた。本研究の目的は、糖尿病患者及び非糖尿病患者の黄色靱帯における組織学的変化および AGE 蓄積量を調査し、糖尿病の有無が黄色靱帯に与える影響を明らかにすることである。</p> <p>【対象と方法】 腰椎手術時に得た黄色靱帯を糖尿病患者肥厚群 (n=10、平均年齢：71.4 歳)、非糖尿病患者肥厚群 (n=10、平均年齢：71.2 歳)、非糖尿病患者非肥厚群 (n=9、平均年齢：49.0 歳) に群分けし、組織学的に検討した。マッソントリクローム (MT) 染色にて弾性線維面積の割合 (%EF) を、また AGE の免疫染色にて免疫染色陽性面積の割合 (%AGE) を計測し、3 群間で比較した。</p> <p>【結果】 平均 %EF は糖尿病患者肥厚群 12.8%、非糖尿病患者肥厚群 17.1%、非糖尿病患者非肥厚群 24.9% であり、弾性線維の減少は糖尿病患者肥厚群で有意に高かった ($p<0.001$)。また免疫染色では弾性線維が破綻している細胞外基質で主に AGE の蓄積が認められた。平均 %AGE は糖尿病患者肥厚群で 18.3%、非糖尿病患者肥厚群で 12.1%、非糖尿病患者非肥厚群で 4.6% であり、糖尿病患者肥厚群で有意に高かった ($p<0.001$)。また糖尿病の有無に関わらず、%AGE は患者の年齢とも有意な正の相関を認めた ($p<0.01$、$R=0.47$)。</p> <p>【結論】 糖尿病患者では弾性線維の減少で表される黄色靱帯の変性が強く、AGE 蓄積量も有意に多かった。しかし糖尿病の有無に関わらず、AGE 蓄積量は患者の年齢とも正の相関が認められた。AGE は組織の変性や線維化に強く関与することが知られており、本研究の結果は AGE が糖尿病患者における黄色靱帯肥厚や加齢性の黄色靱帯肥厚の一因であることを示唆するものと考えられる。</p>	