氏名	Sarun Nunta-aree
学位の種類	博士（医学）
学位記番号	第 4118 号
学位授与年月日	平成14年 3 月25日
学位授与の要件	学位規則第 4 条第 1 項該当者
学位論文名	The morphological development of human basal ganglia ヒトの基底核の発生
論文審査委員	主 査 教 授 原 充弘 副主査 教 授 木山 博資 副主査 教 授 中島 裕司

論文内容の要旨

【目的】ヒト基底核の発生を形態学的に明らかにするために、基底核発生に相当するCarnegie stage 12-21のヒト胚子を用いて、コンピューターグラフィックスによる3次元再構成画像を作製し基底核及びそれに関連した大脳構造物の発生形態を検討した。

【材料・方法】京都大学附属先天異常標本解析センター保有の約2千ヒト胚子の切片標本(Hematoxylin&Eosin染色)中、完全な連続切片として保管してあるCarnegie stage 12-21の胚子を用いた。これらの連続切片を全てデジタル画像化し(Nikon digital camera Coolpix 910,Nikon)、さらにコンピューターグラフィックス(TRI 32, Ratoc Systems Engineering Company Limited, Tokyo)を用いて3次元再構成画像の作製を行い、形態観察した。

【結果】1) Carnegie stage 12、13期における胚子の間脳では、中脳の分界溝は間脳脳室の視床下部溝として乳頭体陥凹を経て、終脳脳室の前視陥凹へと連なっていた。2) Carnegie stage 14期の終脳には、内側と外側基底核稜が形成されていた。間脳の分界溝はこの2稜間の溝として終脳に連なり、16-19期には側脳室形成に伴って、分界溝がモンロー孔を経て側脳室稜間溝を走行していた。内側基底核稜は終脳の基底板、外側基底核稜は終脳の翼板であり、終板は終脳の底板であった。3) 後期胚子では、基底核稜と総ての基底核と扁桃体が関連し、Carnegie stage 19期には尾状核頭部と内側中隔核、20期に淡蒼球内側部、そして21期には前視部がそれぞれ終脳の内側基底核稜から発生していた。4) Carnegie stage 16期には前梨状部、17期には嗅球、19期には尾状核頭部と中隔側核部など、20期には淡蒼球外側部と被殻、21期には尾状核体部と扁桃体、さらに扁桃体よりその後方に伸展して形成される尾状核尾部などが、それぞれ終脳の外側基底核稜より生ずることが観測された。5) Carnegie stage 15期の終脳脳室壁が16期になると陥入して嗅結節脳室となりこの壁より嗅結節形成されていた。

【結論】基底核及びそれに関連した大脳構造物は総て胚子初期から終脳の構造物として発生したものであると考えられた。

論文審査の結果の要旨

【目的】ヒト基底核の発生を形態学的に明らかにするために、基底核発生に相当するCarnegie stage 12-21のヒト胚子を用いて、コンピューターグラフィックスによる3次元再構成画像を作製し基底核及びそれに関連した大脳構造物の発生形態を検討した。

【材料・方法】京都大学附属先天異常標本解析センター保有の約2千ヒト胚子の切片標本(Hematoxylin & Eosin染色)中、完全な連続切片として保管してあるCarnegie stage 12-21の胚子を用いた。これら

の連続切片を全てデジタル画像化し、(Nikon digital camera Coolpix 910, Nikon)、さらにコンピューターグラフィックス (TRI 32, Ratoc Systems Engineering Company Limited, Tokyo) を用いて3次元再構成画像の作製を行い、形態観察した。

【結果】1) Carnegie stage 12、13期における胚子の間脳では、中脳の分界溝は間脳脳室の視床下部溝として乳頭体陥凹を経て、終脳脳室の前視陥凹へと連なっていた。2) Carnegie stage 14期の終脳には、内側と外側基底核稜が形成されていた。間脳の分界溝はこの2稜間の溝として終脳に連なり、16-19期には側脳室形成に伴って、分界溝がモンロー孔を経て側脳室稜間溝を走行していた。内側基底核稜は終脳の基底板、外側基底核稜は終脳の翼板であり、終板は終脳の底板であった。3) 後期胚子では、基底核稜と総ての基底核と扁桃体が関連し、Carnegie stage 19期には尾状核頭部と内側中隔核、20期に淡蒼球内側部、そして21期には前視部がそれぞれ終脳の内側基底核稜から発生していた。4) Carnegie stage 16期には前梨状部、17期には嗅球、19期には尾状核頭部と中隔側核部など、20期には淡蒼球外側部と被殻、21期には尾状核体部と扁桃体、さらに扁桃体よりその後方に伸展して形成される尾状核尾部などが、それぞれ終脳の外側基底核稜より生ずることが観察された。5) Carnegie stage 15期の終脳脳室壁が16期になると陥入して嗅結節脳室となりこの壁より嗅結節が形成されていた。

【結論】基底核及びそれに関連した大脳構造物は総て胚子初期から終脳の構造物として発生したものであると考えられた。

以上の研究は、脳の基底核の発生をヒト胚子で解明したもので、脳の先天性異常発生に寄与すると考えられる。よって本研究者は博士(医学)の学位を授与されるに値すると認められた。